

DYCLO[®] GR-50 Capsules

(Diclofenac Sodium)

Dyclo GR-50, the brand of diclofenac sodium, is an anti-inflammatory, analgesic and antipyretic agent. Chemically it is sodium [2-(2, 6-dichloroanilino) phenyl] acetate.

Composition:

Each capsule contains: Diclofenac Sodium enteric coated pellets
equivalent to Diclofenac Sodium.....50mg.
Manufacturer's Specification.

Actions:

1. Dyclo GR-50 is a non-steroidal anti-inflammatory agent that possess analgesic and antipyretic activities. Its mode of action, like that of other non-steroidal anti-inflammatory agents, is not known; however its therapeutic action is not due to pituitary-adrenal stimulation, but may be from the inhibitory action in the synthesis of prostaglandin.

2. Dyclo GR-50 exhibits very marked anti rheumatic, anti-inflammatory, analgesic and antipyretic properties and is thus suitable for use in inflammatory and degenerative rheumatic diseases, as well as for the treatment of post-traumatic inflammation and swelling.

3. The capsules are covered with an acid resistant protective coating, with the result that the active substance is not released until it has passed through the stomach.

Indications:

Inflammatory and degenerative forms of rheumatism, rheumatoid arthritis, juvenile rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, osteoarthritis and spondyl-arthritis.

- Painful syndromes of the vertebral columns
- Non-Articular rheumatism.
- Acute attack of gout.
- Painful post traumatic and postoperative inflammation and swelling of orthopedic surgery.
- Painful and inflammatory condition in gynecology, e.g. Primary dysmenorrhoea & adnexitis.
- As an adjuvant therapy in severe painful inflammatory infection of ear, nose & throat.
- Painful Post-operative, Inflammatory Condition of Dental Surgery.

Dosage and Administration:

In adults the average dosage is 1 capsule 2-3 times daily, also for long-term therapy. If necessary, the daily dose can be raised. The capsule should be swallowed whole during or after meals. To be administered according to doctor's prescription.

Side effects:

At the start of treatment patients may complain of epigastric pain, eructation, nausea and diarrhoea, headache, dizziness. These side effects, however are usually of a mild nature and generally disappear after a few days despite continuation of the medication. Skin rashes may also occur very occasionally.

Cautions:

1. In accordance with currently accepted views on the employment of drugs during pregnancy, **Dyclo GR-50** should not be prescribed in the first three months of pregnancy unless its use is strictly indicated.
2. Patients with gastro-intestinal disturbances or with a history of peptic ulcer, as well as those suffering from severe hepatic or renal damage, should be kept under close surveillance.

Availability:

Dyclo GR-50 Capsule : Pack of 6x5 Capsules

ڈائی کلو جی آر - 50 (ڈکلو فینک سوڈیم)

خوراک اور طریقہ استعمال:

بالغ افراد کیلئے: ایک کپسول مناسب وقفوں سے دن میں دو یا تین مرتبہ استعمال کریں۔ ابتدائی خوراک 100 سے 150 ملی گرام روزانہ تک دی جاسکتی ہے۔ خوراک 2 سے 3 حصوں میں تقسیم کر کے دیں۔ کپسول ترجیحاً کھانے کے ساتھ پانی سے لیں۔ دوا خالی پیٹ نہ لیں۔ دوا ہر صورت میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

بچوں کیلئے:

خوراک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دیں۔

خصوصی ہدایات برائے مریض:

ڈائی کلو جی آر - 50 سو جن ختم کرتی ہے اور درد کو رفع کرتی ہے۔ خوراک اور طریقہ استعمال مریض کی انفرادی کیفیت کے مطابق ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت کو نہایت احتیاط سے یقینی طور پر سمجھیں۔

اگر چکر یا مرکزی اعصابی نظام کی علامات ظاہر ہوں، تو گاڑی اور مشینری چلانے میں احتیاط سے کام لیں۔ اگر علامات شدید ہوں مثلاً معدہ میں بے چینی، کالا پاخانہ، جلد پر دھبے، یا دمہ کا حملہ ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین ڈاکٹر کو ان علامات سے مطلع کریں۔ اگر کوئی اور دوا بھی آپ کے استعمال میں ہو تو ڈاکٹر کو ضرور مطلع کریں۔

معدے اور آنتوں کے امراض کی شدید خرابی، السر، بلند فشارِ خون، دل، جگر، گردوں کے امراض اور بوڑھے مریضوں میں طبی توجہ اور نگرانی لازم ہے۔

احتیاط:

گرمی، روشنی اور نمی سے محفوظ رکھیں۔

30°C سے کم درجہ حرارت پر اسٹور کریں۔

تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

Keep all medicines out of the reach of children.



Manufactured by :

Indus Pharma (Pvt.) Ltd.

65/27, Korangi Industrial Area,
Karachi-74900, Pakistan.